

屏基醫療財團法人屏東督教醫院

常用藥物

本院查詢路徑說明：院內網路資訊系統--輸入職編及密碼--藥品查詢系統

一、解熱鎮痛劑

| 藥名/劑型 | 適用症狀 | 副作用 |
|-------------------------------|------------|---|
| Panadol 500mg/tab | 解熱鎮痛 | 溶血性貧血、嗜中性球缺乏、血小板缺乏、皮膚發疹、蕁麻疹及紅斑、發燒、肝損害、偶有過敏反應 |
| Ponstan 250mg/cap(Ponstal) | 解熱鎮痛、抗發炎 | 偶有-消化不良、頭暈、貧血、血小板減少、白血球減少、心悸、呼吸困難、神經質、精神紊亂 嚴重者-胃腸出血、顆粒性白血球缺乏症等 |
| Keto(Laston) 30mg/amp | 消炎、解熱、鎮痛 | 水腫、消化不良、頭痛、發汗、暈眩。 |
| Ketoprofen 50mg/amp | 消炎、止痛、解熱 | 頭暈、過敏、頭痛、液體滯留 |
| Voltaren 12.5mg/supp | 解熱鎮痛 退燒 | 皮膚疹、腹部不適、消化性潰瘍、延長出血時間 |

二、腸胃用藥

| 藥名/劑型 | 作用 | 副作用 |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| Gascon (GASLAN) 40mg/tab | 消除胃腸道內氣體 | 腸胃不適 GI upset、腹瀉 diarrhea、嘔吐 vomiting、食慾差 anorexia. |
| Primperan 3.84mg/tab(promeran) | 幫助胃腸蠕動、止吐 | 腹瀉 Diarrhea、煩躁不安 restless、EPS、催乳素刺激 prolactin stimulation |
| Strocain | 急性或慢性胃炎所引起的胃痛、不快感 | 皮膚炎 Dermatitis、頭暈 dizziness、嗜睡 drowsiness |
| Mag.Oxide 250mg/tab | 軟便 | |
| Zantac(Ranitidine)150mg/tab | 胃或十二指腸潰瘍 | 頭痛、頭暈、腹瀉、便秘、胃部不適、血小板減少症 |

三、降血糖

| 藥名/劑型 | 作用 | 副作用 |
|----------------------------------|--------|--------------|
| Amaryl(Glimepine) 2mg/tab | 降血糖 | 低血糖、噁心、嘔吐 |
| Glucophage 500mg/tab(Loditon) | 糖尿病 | 厭食、胃灼熱、便秘、減肥 |
| NovoNorm 1mg(Repaglinide) | 降血糖 | 低血糖、腹瀉、噁心 |
| Trajenta 5mg Film-Coated/tab | 第二型糖尿病 | 鼻咽炎、腹瀉、咳嗽 |

四、降壓劑

| 藥名/劑型 | 作用 | 副作用 |
|--------------------------|---------|-------------------------------|
| Adalat 5mg(Atanaal/cap) | 高血壓、狹心症 | 潮紅、頭痛、虛弱、眩暈、噁心、頭重腳輕、末梢水腫、低血壓。 |
| Norvasc 5mg/tab(Amlodac) | 高血壓、心絞痛 | 頭痛、水腫、疲倦、噁心、臉部潮紅和暈眩 |

五、化痰止咳

| 藥名/劑型 | 作用 | 副作用 |
|-------------------------------|-----|--|
| Flumucil 愛克痰 100mg/包 (Actein) | 祛痰劑 | 嘔吐、氣味不佳、暈眩、氣道刺激、支氣管痙攣 |
| Medicon 30mg/tab (Methon) | 止咳 | 嗜睡 Drowsiness、coma、respiratory depression、GI upset、abdominal discomfort. |

六、抗生素

| 藥名/劑型 | 作用 | 副作用 |
|----------------------------|-----|---|
| CEFAZOLIN g/vial(Stazolin) | 抗感染 | 過敏反應 Anaphylaxis、皮疹 rash、腹瀉 diarrhea |
| Gentamicin 80mg/vial | 抗感染 | 耳毒性 Ototoxicity、腎毒性 nephrotoxicity、神經肌肉阻滯 neuromuscular block |

七、兒科

| 藥名/劑型 | 作用 | 副作用 |
|----------------------------------|-----------------------|--|
| Acetaminophen(Anti-phen)60ml/bot | 解熱鎮痛劑(退燒) | 服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴等症狀時，應停藥並就醫。 |
| Ibuprofen(60cc/bot)20mg/ml | 抗發炎，解熱鎮痛(退燒)。 | 噁心、嘔吐、胃灼熱、胃痛、腹瀉、食慾不振隱發性出血等胃腸障礙；皮疹或肝指數上升、頭暈、頭痛、水腫。 |
| Augmentin 600mg/Vial(AmoClav) | 抗感染 | GI reaction, headache, vaginal candidiasis |
| Ampicillin 500mg/Vial(Ampolin) | 抗感染 | Allergy reaction, skin rash, diarrhea, headache |
| Salbutamol nebulas 5mg/2.5ml/amp | 支氣管痙攣、急性嚴重性氣喘。 | 心跳過速，心悸，高血壓，心律不整。(Palpitation, hypertension, cardiac arrhythmias.) |
| Voltaren 12.5mg/supp(外用塞劑) | 解熱鎮痛、退燒 | 皮膚疹、腹部不適、消化性潰瘍、延長出血時間。 |
| Kenacomb cream(Mycomb)20gm/tub | 治療念珠菌感染及過敏性皮膚炎。(治療紅臀) | |

八、婦產科

| 藥名/劑型 | 作用 | 副作用 |
|--------------------------------|--|--------------------------------|
| Piton-S(Oxocin)10iu/1ml/amp | 子宮收縮促劑，催產劑，減少產後出血 | 心動過緩，心律不齊，顱內出血 |
| Methergin 0.2mg/ml/amp | 產後子宮出血 | 高血壓，噁心。 |
| MTX(Methotrexate) 500mg/vial** | 妊娠性絨毛上皮癌，破壞性絨毛上皮腺腫，水囊狀胎塊，急性，亞急性，淋巴球性及腦膜性白血病，淋巴肉腫 | 白細胞減少症，噁心，腹部不適，疲勞，氣孔，寒熱，頭暈 |
| Spersin ointment 10g/tube | 抗感染及抗發炎作用 | 耳毒性與腎毒性 |
| Cytotec 200mcg/tab | 引產 | 腹瀉，腹痛，消化不良，月經過多。 位置：陰道出血，皮疹 |
| Ergo 0.2mg/tab (子宮收縮) | 預防和治療產後或流產後子宮收縮不良 | 噁心，嘔吐，心慌，短暫的胸痛，高血壓，頭暈 |
| Rinderon(Betamethasone)4mg/ml/ | 抗炎，抗過敏 | 失眠，消化不良，食慾增加 |
| Yutopar 50mg/5ml/amp(Anpo)*** | 預防早產、流產 | 震顫，暫時性高血糖 |
| MgSO4 2000mg/20ml/AMP | 孕婦尿毒，妊娠高血壓 | 硫酸鎂中毒 |
| Dostinex 0.5mg/tab | 抑制產後乳汁分泌 | 噁心，嘔吐，失眠，焦慮 |
| Provera 5mg/tab(Medrone) | 賀爾蒙的替代療法 | 體重增加，閉經，腦血管疾病 |
| Premarin (Estromon) 0.625/tab | 荷爾蒙輔助療法 | 乳房疼痛，壓痛，閉經 |
| Flagyl VT 250mg/supp(陰道塞劑) | 陰道滴蟲感染引起之陰道炎 | 搔癢感、腔壁充血和局部發紅等過敏 |
| Transamin 250mg/5ml/amp | 消炎、止血 | 嘔吐，噁心，腹瀉 |
| Utrogestan(Promore)100mg/soft | 流產，早產的預防，排卵異常，乳腺痛，月經困難，經血過多 | 出血 |
| Ferrum Hausmann(Tedalin)100mg/ | 治療及預防缺鐵性貧血 | 便秘，下痢，腹痛，消化不良 |