

屏基醫療財團法人屏東督教醫院

高警訊藥物

高警訊藥物由於其藥效強、危險性高，一旦發生疏失常對病人造成難以補救之生理或生命傷害。

以下有提醒措施：

1. 藥袋上之藥名後面加註***。
2. 護理給藥作業系統，於該藥物加註【讀】字提醒。
3. 住院、急診藥袋加註【高警訊】字樣。

壹、本院高警訊藥品品項分類

英文	中文
(1) Immunosuppressant agents	(1) 免疫抑制劑
(2) Moderate sedation agents, oral, for children	(2) 兒童口服中度鎮靜劑
(3) Inotropic agents	(3) 強心劑
(4) Adrenergic agonists, IV	(4) 腎上腺素促進劑
(5) Antiarrhythmics, IV	(5) 抗心律不整藥
(6) Antithrombotic agents	(6) 抗血栓藥
(7) Hypoglycemic agents, oral	(7) 口服降血糖藥
(8) Chemotherapeutic agents, parenteral and oral	(8) 腸胃外和口服化學治療劑
(9) Antiretroviral agents	(9) 抗逆轉錄病毒藥
(10) Neuromuscular blocking agent	(10) 神經肌肉阻滯劑
(11) Anesthetic agents, general, inhaled and IV	(11) 全身麻醉劑，吸入和靜脈麻醉劑
(12) Moderate sedation agents IV	(12) 調節性鎮靜劑
(13) Adrenergic antagonists, IV	(13) 腎上腺素抑制劑
(14) Dextrose, hypertonic, 20% or great	(14) 20%或更高滲透葡萄糖
(15) Potassium chloride for injection concentrate	(15) 注射用濃縮氯化鉀
(16) Cardioplegic solution	(16) 心臟麻醉灌液
(17) Insulin, subcutaneous and IV	(17) 胰島素，皮下和靜脈注射
(18) Liposomal forms of drugs	(18) 脂質形式的藥物
(19) Radiocontrast agents, IV	(19) 造影劑
(20) Sodium chloride for injection, hypertonic, greater than 0.9% concentration	(20) 濃度大於 0.9% 高滲注射用氯化鈉

貳、常見高警訊用藥

一、降血糖

藥名/劑型	作用	副作用
Amaryl(Glimepine) 2mg/tab	降血糖	低血糖、噁心、嘔吐
Glucophage 500mg/tab(Loditon)	糖尿病	厭食、胃灼熱、便秘、減肥
NovoNorm 1mg(Repaglinide)	降血糖	低血糖、腹瀉、噁心
Trajenta 5mg Film-Coated/tab	第二型糖尿病	鼻咽炎、腹瀉、咳嗽

二、降壓劑

藥名/劑型	作用	副作用
Adalat 5mg(Atanaal/cap)	高血壓、狹心症	潮紅、頭痛、虛弱、眩暈、噁心、頭重腳輕、末梢水腫、低血壓。
Norvasc 5mg/tab(Amlodac)	高血壓、心絞痛	頭痛、水腫、疲倦、噁心、臉部潮紅和暈眩

三、調節性鎮靜劑

藥名/劑型	作用	副作用
Dormicum 15mg/amp(Midatin)	鎮靜、麻醉、安眠	低血壓、心搏過緩
Valium 10mg/Amp(Dianlin)	精神神經安定劑	嗜睡、便秘、噁心